

Symptomsjekkliste for ADHD- selvrapporteringskala for voksne (ASRS-v1.1)

Pasientens navn	Dato					
Svar på spørsmålene nedenfor. Vurder deg selv i forhold til kriteriene ved hjelp av skalaen til høyre på arket. For hvert spørsmål krysser du av i den ruten som best beskriver hvordan du har følt og oppført deg de siste seks månedene. Etter at du har fylt ut denne sjekklisten, gir du den til din behandler, slik at dere kan diskutere den i løpet av dagens time.		Aldri	Sjelden	I blant	Ofte	Svært ofte
1. Hvor ofte har du problemer med å avslutte en oppgave etter at de interessante delene er unnagjort?						
2. Hvor ofte er det vanskelig for deg å få orden på ting når du skal utføre en oppgave som krever organisering?						
3. Hvor ofte har du problemer med å huske avtaler eller forpliktelser?						
4. Når du har en oppgave som krever at du tenker nøye igjennom det du skal gjøre, hvor ofte unngår eller utsetter du å begynne på den?						
5. Hvor ofte sitter du og fikler med noe når du må sitte lenge i ro?						
6. Hvor ofte føler du deg overdrevet aktiv og tvunget til å gjøre noe, som om du var drevet av en indre motor?						
Del A						
7. Hvor ofte gjør du slurvfeil når du må jobbe med en kjedelig eller vanskelig oppgave?						
8. Hvor ofte har du problemer med å holde oppmerksomheten oppe når du gjør kjedelig eller ensformig arbeid?						
9. Hvor ofte har du vansker med å konsentrere deg om hva folk sier, selv når de snakker direkte til deg?						
10. Hvor ofte har du vanskeligheter med å finne igjen ting hjemme eller på jobb?						
11. Hvor ofte blir du distrauert av aktiviteter eller lyder rundt deg?						
12. Hvor ofte forlater du plassen din på møter eller i andre situasjoner der det forventes at du blir sittende?						
13. Hvor ofte føler du deg rastløs eller urolig i kroppen?						
14. Hvor ofte har du vanskelig for å ta det med ro og slappe av når du har tid for deg selv?						
15. Hvor ofte opplever du å snakke for mye i sosiale sammenhenger?						
16. Hvor ofte opplever du at du fullfører setninger for andre før de rekker å fullføre dem selv?						
17. Hvor ofte har du problemer med å vente på tur i situasjoner der dette er nødvendig?						
18. Hvor ofte avbryter du andre når de holder på med noe?						
Del B						

Symptomsjekkliste for ADHD- selvrapporeringskala for voksne (ASRS-v1.1)

Instruksjoner

Spørsmålene på baksiden er utarbeidet for å stimulere til dialog mellom deg og pasientene og å bidra til å avgjøre om de kan lide av symptomer forbundet med attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD).

Beskrivelse: Symptomsjekklisten er et instrument som består av de atten DSM-IV-TR-kriteriene. Seks av de atten spørsmålene har vist seg å være mest forutsigbare for symptomer som er overensstemmende med ADHD. Disse seks spørsmålene utgjør grunnlaget for ASRS v1.1 Screener og er også del A av symptomsjekklisten. Del B av symptomsjekklisten inneholder de tolv resterende spørsmålene.

Instruksjoner:

Symptomer

1. Be pasienten fylle ut både del A og del B av symptomsjekklisten ved å krysse av i den ruten som best beskriver hvor hyppig hvert symptom forekommer.
2. Legg sammen svarene i del A. Hvis det er fire eller flere kryss i de skraverte rutene i del A, har pasienten symptomer som i stor grad er overensstemmende med ADHD hos voksne. Videre utredning anbefales.
3. Svarene i del B gir ytterligere informasjon og kan tjene som utgangspunkt for videre utredning av pasientens symptomer. Vær særlig oppmerksom på kryss i skraverte ruter. Frekvensen av angivelsene blir ulikt vektet for de ulike spørsmålene. For de tolv spørsmålene regnes det verken ut samlet poengsum eller anvendes diagnostisk sannsynlighet. Det har vist seg at de seks spørsmålene i del A er de som er mest forutsigbare for ADHD og er best egnet som screeninginstrument.

Funksjonssvekkelse:

1. Gå gjennom hele symptomsjekklisten med pasienten og vurder graden av funksjonssvekkelsen som er forbundet med symptomene.
2. Ta arbeid/skole, sosialt liv og familieliv med i betraktningen.
3. Symptomhyppighet og – styrke henger ofte sammen. Symptomsjekklisten kan derfor være til hjelp i evaluering av funksjonssvekkelsen. Dersom pasientene har hyppige symptomer, kan det være nyttig å be dem beskrive hvordan disse problemene har påvirket evnen til å arbeide, gjøre husarbeid eller komme overens med andre mennesker, f.eks. ektefelle/partner, samboer eller andre nærpå personer.

Historie:

1. Vurder om disse eller lignende symptomer var til stede i barndommen. Voksne med ADHD behøver ikke formelt ha fått diagnosen som barn. I evalueringen av pasientens historie bør du se etter belegg for tidlig forekommende og langvarige vansker med oppmerksomhet eller problemer med selvkontroll. Enkelte viktige symptomer bør ha forekommet i barndommen, men alle symptomene trenger ikke å ha vært til stede.